

Åtgärder efter suicid och suicidförsök

	Direkt efter händelsen	Kortare sikt (ca 1 vecka – 1 månad)	Längre sikt (ca 1 månad – 1 år)	
Närstående* 	Informera om händelsen och erbjud stöd.	Undersök behov av fortsatt stöd och informera om kommande utredning.	Efterfråga närståendes beskrivning av händelsen som del i ert underlag för utredning.	Delge de närstående era preliminära utredningsresultat och ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Justera eventuellt er analys.
Vårdpersonal** 	Informera om händelsen och erbjud stöd.	Undersök behov av fortsatt stöd och informera om kommande utredning.	Efterfråga berörd vårdpersonals beskrivning av händelsen som del i ert underlag för utredning.	Delge berörd vårdpersonal era preliminära utredningsresultat och ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Justera eventuellt er analys.
Verksamhetsutveckling 	Dokumentera händelsen och påbörja er utredning utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.	Gör en anmälan till IVO om ni direkt konstaterar att händelsen utgjort eller bidragit till allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada.	Genomför era beslutade åtgärder.	Gör en anmälan till IVO om ni bedömer att allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada har inträffat. Utvärdera åtgärderna.

*Både patienten och närstående kan vara i behov av mer akuta stödinsatser efter ett allvarligt suicidförsök. Vid suicid finns oftast efterlevande som är i behov av stödinsatser.

**Om händelsen inträffat inom slutenvård uppmärksamma om ineliggande patienter är i behov av information och stöd.